Termoablación:
Tratamiento para VPH (Virus del Papiloma Humano)

PROYECTO PRECÁNCER

* Consiste en aplicar una sonda en el cuello uterino que destruye las células afectadas por el virus.
* Esta sonda funciona con calor y se aplica durante 40 segundos.
* Durante este tratamiento, la paciente podría sentir un ligero cólico como el de la menstruación.

¿En qué consiste el tratamiento?



Este tratamiento con **calor** dura solo **40 segundos**.

Termocoagulador

ES NORMAL:

* Flujo vaginal durante aproximadamente 6 semanas:
  - Como agua
  - Claro
  - Abundante
  - A veces como moco (blanco o amarillo)
* Ligero cólico tipo menstruación por 1 o 2 días.
* Sangrado (menos que una menstruación) durante aproximadamente 1 semana.

*Se recomienda utilizar toallas higiénicas y cambiarlas 2 veces al día.

Después del tratamiento:

Es normal

Flujo vaginal abundante

Ligero cólico tipo menstruación



Sangrado (menos que una menstruación)

SEÑALES DE ALARMA

* Sangrado vaginal abundante (mayor al del ciclo menstrual).
* Dolor abdominal intenso (más fuertes que el dolor típico de los cólicos menstruales).
* Fiebre mayor a 38 grados.
* Flujo vaginal tipo pus con olor fétido/maloliente.

*Si presenta cualquiera de estas señales, acuda al centro de salud más cercano.

Después del tratamiento:

⊗ Señales de Alarma

Sangrado vaginal abundante



Dolor abdominal intenso



Fiebre mayor a 38 grados



Flujo vaginal tipo pus y maloliente

Si presenta cualquiera de estas señales, acudir al centro de salud más cercano.

DURANTE EL PRIMER DÍA: No hacer esfuerzo físico, descansar.
A partir del 2do día realizar sus actividades normales.

DURANTE LAS SIGUIENTES 6 SEMANAS:

* Lo ideal es evitar las relaciones sexuales. Si esto no es posible, se podría luego de 3 semanas usando condón.

* No hacerse duchas vaginales, no tocarse con los dedos y no introducirse nada como hierbas o pastillas.

LUEGO DE 6 SEMANAS:

* Acudir a tu cita de control con tu obstetra a tu centro de salud.

LUEGO DE 1 AÑO:

* Visita tu centro de salud para realizarte una nueva prueba de control **(puede ser prueba molecular, IVAA o papanicolaou)**.

Recomendaciones después del tratamiento

▸ Durante el primer día:

No hacer esfuerzo físico y descansar.

▸ Durante las siguientes 6 semanas:

No introducirse nada en la vagina.

IMPORTANTE:
No tener relaciones sexuales.

▸ Luego de 1 año:

Visita tu centro de salud para realizarte **una nueva prueba de control.**



* Es posible que tu doctor te pida que vuelvas antes para un control.

¡La prueba molecular salva vidas!

PROYECTO
PRECÁNCER

Síguenos en Facebook:
Proyecto Precáncer

Síguenos en Instagram:
@proyectoprecancer

Búscanos en Youtube:
Proyecto Precáncer

Encuentra más material informativo, herramientas educativas y vídeos en **www.proyectoprecancer.org**

Esta edición ha sido posible gracias a:

Tulane University

prisma

University of Vermont

Edición impresa actualizada el 25/09/2024.